

ስለ ፓክሰሎቪድ ማወቅ ያለብዎት

ፓክሰሎቪድ ምንድነው?

ፓክሰሎቪድ በኮቪድ-19 እንዳይታመሙ የሚከላከል መድኃኒት ነው።

ኮቪድ-19 በሰውነት ውስጥ እንዳይሠራ ለማስቆም በጋራ አብረው የሚሠሩ ሁለት መድኃኒቶችን (nirmatrelvir (ኒርማትሬልቪር) እና ritonavir (ሪቶናቪር)) ይዟል።

ፓክሰሎቪድ የሕመም ስሜቶች እንዳይባባሱ ሊያደርግና በኮቪድ-19 ምክንያት ወደ ሆስፒታል የመሄድ ዕድልን ሊቀንስ ይችላል።

ፓክሰሎቪድ በኮቪድ-19 እንደገና ከመያዝ አያግድዎትም።

ፓክሰሎቪድ የከትባት ምትክ አይደለም። ከከባድ የኮቪድ-19 ኢንፌክሽን በጣም ጥሩው መከላከያ ወቅታዊ ክትባቶችን መውሰድ ነው።

ፓክሰሎቪድን መውሰድ ያለበት ማነው?

በኮቪድ-19 ምክንያት ለከባድ ሕመም ተጋላጭ ከሆኑ ፓክሰሎቪድን መውሰድ ይችላሉ። ፓክሰሎቪድ በደንብ እንዲሠራ የሕመም ምልክቶች በጀመሩ በአምስት ቀናት ውስጥ መውሰድ መጀመር አለብዎት።

ለከባድ ሕመም የመጋለጥ ዕድልዎ በጤናዎ፣ ዕድሜዎ እና በክትባትዎ ሁኔታ ላይ የተመሠረተ ነው።

አንድ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ከፍተኛ አደጋ ላይ ከሆኑ ሊነግርዎት/ልትነግርዎት ይችላል/ትችላላች። በተጨማሪም ከፍተኛ አደጋ ላይ ሊወድቁ እንደሚችሉ ለማወቅ የአንታሪዮን ማጣሪያ መሳሪያን መጠቀም ይችላሉ፡- <https://covid-19.ontario.ca/covid-treatment-screener>

የሚከተሉት ከሆኑ ከፍተኛ አደጋ ሊያጋጥምዎት ይችላል፡-

- ✓ ዕድሜዎ 60 ወይም ከዛ በላይ፤
- ✓ 18 ወይም ከዛ በላይ እና የሰውነትዎ ከበሽታ የመከላከል አቅም የተዳከመ ከሆነ (በበሽታ ወይም በመድኃኒቶች ምክንያት የሰውነትዎ ከበሽታ መከላከያ ሥርዓት የተዳከመ ከሆነ)፤
- ✓ ከ18 እስከ 59 ዓመት እና የኮቪድ-19 በቂ መከላከያ ከሌለዎት (ለምሳሌ አልተከተቡም ወይም ክትባት ከወሰዱ ወይም ኮቪድ-19 ከያዝዎት ከሰድስት ወር በላይ ከሆነ)፤
- ✓ ከ18 እስከ 59 ዓመት እና ለከባድ ኮቪድ-19 ተጋላጭ የሚያደርጉ አንድ ወይም ከዛ በላይ የጤና እክሎች። ለከባድ ኮቪድ-19 ተጋላጭ የሚያደርጉ አንዳንድ የጤና እክሎች የሚከተሉት ናቸው፡-

- ካንሰር
- የአንጎልና ደምስሮች በሽታ (ለምሳሌ ስትሮክ)
- የኩላሊት በሽታ
- የጉበት በሽታ
- የሳንባ በሽታ
- ሲስቴክ ፋይብሮሲስ
- የስኳር በሽታ
- የአካል/የአእምሮ ጉዳዮች
- የልብ በሽታዎች
- የHIV በሽታ
- አንዳንድ የአእምሮ ጤና በሽታዎች
- ከመጠን ያለፈ ውፍረት
- እርግዝና እና በቅርብ ጊዜ የነበረ እርግዝና
- ማጨስ (የአሁን ወይም የቀድሞ)
- ነቀርሳ

በኮቪድ-19 ምክንያት ለከባድ ሕመም የመጋለጥ ስጋት ላይ ነኝ ብለው ካሰቡ ስለ አማራጮች ለመወያየት የጤና እንክብካቤ አቅራቢን ያነጋግሩ።

ኮቪድ-19 የያዘኝ ይመስለኛል። ፓክሰሎቪድ የማግኘው እንዴት ነው?

ምልክቶችዎን እዚህ ጋር ማጣራት ይችላሉ፡- covid-19.ontario.ca/exposed#symptoms

ለከባድ ሕመም ተጋላጭ ነኝ ብለው ካሰቡና የኮቪድ-19 ምልክቶች ካሉብዎት የሚከተሉትን ማድረግ ይችላሉ፡-

- መድኃኒት ቤትዎ ጋር መደወል (በርካታ መድኃኒት ቤቶች ፓክሰሎቪድን ማዘዝ ይችላሉ)
- ዋና ሕክምና አቅራቢዎ ጋር መደወል (የቤተሰብ ዶክተር ወይም ነርስ ፕራክቲሽነር)

በተጨማሪም ጥያቄ ካልዎት ወይም እርዳታ ካስፈለግዎት Health811 ጋር መደወል ይችላሉ። 811 ይደውሉ ወይም ከነርስ ጋር በኢንተርኔት ለመነጋገር ontario.ca/health811ን ይጎብኙ።

ይህ ለእርስዎ የሚሆን ከሆነ Health811 ወደ ምናባዊ እንክብካቤ ምክክር ሊያገናኝዎት ይችላል።

ምልክቶች እንደጀመሩዎት ወዲያውኑ የጤና እንክብካቤ አቅራቢን ማነጋገር አስፈላጊ ነው። ፓክሰሎቪድ በደንብ እንዲሠራ ምልክቶች በጀመሩ በአምስት ቀናት ውስጥ መጀመር አለብዎት።

ከባድ ምልክቶች ካጋጠሙዎት ወደ 911 ይደውሉ ወይም ወደ ድንገተኛ ክፍል ይሂዱ። ከባድ ምልክቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፦

- የመተንፈስ ችግር
- የደረት ሕመም
- እራስን መሳት
- ግራ መጋባት

ከሕክምና አቅራቢዬ ጋር ስለ ፓክስሎቪድ በምነጋገርበት ጊዜ ምን ዓይነት መረጃ ማምጣት ይኖርብኛል?

ከሕክምና አቅራቢዎ ጋር በሚነጋገሩበት ጊዜ የሚከተሉትን ማምጣት ይኖርብዎታል፦

- የሚወስዷቸውን መድኃኒቶች ዝርዝር በሙሉ፣ ዶክተር ያዘዛቸውንም የዶክተር ትእዛዝ የማያስፈልጋቸውንም፣ ቫይታሚኖችን እና ከእፅዋት የተቀመሙ መድኃኒቶችን ጨምሮ
- የሕመሞችዎን ዝርዝር
- ማንኛውም በቅርብ የተደረገ የደም ምርመራ፣ ማግኘት ከቻሉ ምንም ዓይነት አለርጂ፣ የጉበት ወይም የኩላሊት በሽታ ወይም ነፍስ ጡር፣ ጡት እያጠቡ ወይም ባለ ሆርሞን የወለድ መቆጣጠሪያ (እንደ ወለድ መቆጣጠሪያ ኪኒን ወይም ተለጣፊ) እየወሰዱ ከሆነ የሕክምና አቅራቢዎን ያሳውቁ።

ፓክስሎቪድ ለማግኘት የኮቪድ-19 ምርመራ ማድረግ አለብኝ?

ፓክስሎቪድ ለማግኘት ፖዚቲቭ የኮቪድ-19 ምርመራ ውጤት ያስፈልግዎታል። ይህም PCR፣ rapid molecular test (ፈጣን የሞሌኪዩል ምርመራ)፣ ወይም rapid antigen test (ፈጣን የአንቲጅን ምርመራ) ሊሆን ይችላል (በቤት ውስጥም የተደረገ ቢሆን)።

የሕክምና አቅራቢዎን ስለ ፓክስሎቪድ ከማነጋገርዎ በፊት ፖዚቲቭ የምርመራ ውጤት አያስፈልግዎትም። ካስፈለግዎት ምርመራ እንዲያደርጉ እነሱ ያግዙዎታል።

ፓክስሎቪድ ነጻ ነው?

ከሕክምና አቅራቢ ትእዛዝ ካለ ፓክስሎቪድ በነጻ ነው የሚገኘው። ፓክስሎቪድ ለማግኘት የOHIP ካርድ አያስፈልግዎትም።

ፓክስሎቪድን የምወስደው እንዴት ነው?

ፓክስሎቪድ በቀን ሁለት ጊዜ ለአምስት ቀናት በአፍ ይወሰዳል።

ፓክስሎቪድ የጠዋት መጠንና የምሽት መጠን በያዘ ጥቅል ውስጥ ይመጣል። እያንዳንዱ መጠን 2 የnirmatrelvir (ኒርማትሬልቪር) ኪኒኖች (ሮዝ ኪኒኖች) እና 1 የritonavir (ሪቶናቪር) ኪኒን (ጎጭ ኪኒን) አለው።

የኩላሊት በሽታ ያለባቸው ሰዎች ዝቅ ያለ መጠን ሊታዘዝላቸው ይችላል።

ሶስቱንም የጠዋት ኪኒኖች በአንድ ላይ እና ሶስቱንም የምሽት ኪኒኖች በአንድ ላይ ለ5 ቀናት ሙሉ መውሰድ አለብዎት። ፓክስሎቪድ ከምግብ ጋር ወይም ያለ ምግብ መውሰድ ይችላል።

አንድ የፓክስሎቪድ ዙር ሳይወስዱ ጊዜው ካለፈብዎትና መውሰድ ከሚገባዎ ጊዜ ከ8 ሰዓት በታች ከሆነ፣ እንዳስታወሱ ወዲያው ይውሰዱት። ዙሩ ካመለጥዎት ከ8 ሰዓት በላይ ከሆነ፣ ይለፉትና የሚቀጥለውን ዙር ሰዓት ጠብቀው ይውሰዱ። 2 የፓክስሎቪድ መጠኖች (6 ኪኒኖች) በአንድ ጊዜ አይውሰዱ።

ፓክስሎቪድን ሁልጊዜ የሕክምና አቅራቢው በነገርዎት መሠረት ይውሰዱ።

ፓክስሎቪድን በሚወስዱበት ጊዜ በሽታውን ሊያጋቡ ስለሚችሉ ስርጭቱን ለመገደብ የጠና መምሪያ መመሪያዎችን ይከተሉ። ስለ ወቅታዊ የጤና መምሪያ መመሪያዎች እዚህ ያንብቡ፦

<https://www.ontario.ca/page/public-health-measures-and-advice>

የፓክስሎቪድ ተያያዥ ችግሮች ምንድን ናቸው?

ፓክስሎቪድ በሚወስዱበት ጊዜ የሚከተሉት ተያያዥ ችግሮች ሊያጋጥሙዎት ይችላሉ፦

- የጣዕም መቀየር
- ተቅማጥ
- ከፍተኛ ደም ግፊት
- የጡንቻ ሕመም
- የሆድ ሕመም
- ማቅለሽለሽ
- ባጠቃላይ ጤና ማጣት

ሌሎች ተያያዥ ችግሮች ሊያስተውሉ ይችላሉ። የሚያስቸግሩዎት ወይም የማይጠፉ ተያያዥ ችግሮች ካሉዎት የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያነጋግሩ።

ሌሎች ያልተለመዱ ሆኖም ሊከሰቱ የሚችሉ የፓክስሎቪድ ተያያዥ ችግሮች የሚከተሉት ናቸው፡-

- **የአለርጂ ምላሾች።** የአለርጂ ምላሽ ከሆኑት ከሚከተሉት የአለርጂ ምልክቶች አንዱ ካጋጠምዎት ፓክስሎቪድ መውሰድ ያቁሙና የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር ይደውሉ፡- ቆዳዎ ላይ የሚያሳክኩ ቦታዎች (እብጠቶች)፣ የመዋጥ ወይም የመተንፈስ ችግር፣ የከንፈር፣ የፊት ወይም የምላስ እብጠት፣ የጉሮሮ መጥበብ ወይም መጎርጎን።
- **የጉበት ችግሮች።** ከሚከተሉት የጉበት ችግር ምልክቶች አንዱ ካልዎት የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ወዲያው ያሳውቁ፡- ቢጫማ ቆዳ ወይም ዓይን (ጆንዲስ)፣ ያልተለመደ ጠቆር ያለ ሽንት፣ በሆድዎ በቀኝ በኩል አዲስ ሕመም።
- **የኤችአይቪ መድኃኒቶች እንዳይሠሩ ማድረግ።** ሕክምና ያልተደረገለት የኤችአይቪ ኢንፌክሽን ካለብዎት፣ ፓክስሎቪድ አንዳንድ የኤችአይቪ መድኃኒቶችን ወደፊት በደንብ እንዳይሠሩ ሊያደርግ ይችላል።

ሌሎች መድኃኒቶችን እየወሰድኩ ፓክስሎቪድንም መውሰድ እችላለሁ?

ፓክስሎቪድ ብዙ በብዛት ጥቅም ላይ ከሚውሉ መድኃኒቶችና ማሟያዎች ጋር አብሮ መሥራት ይችላል። ፓክስሎቪድን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ መውሰድ እንዲችሉ አንድ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ (ለምሳሌ ፋርማሲስት) ሌሎቹ መድኃኒቶችዎ ላይ ለውጥ ሊያደርግ/ልታደርግ ይችላል/ትችላላች።

በተጨማሪም ፓክስሎቪድ በሆርሞን የሚሠሩ የወሊድ መቆጣጠሪያዎች ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል። ፓክስሎቪድ በሚወስዱበት ጊዜ ሌላ ዓይነት የወሊድ መቆጣጠሪያ መጠቀም አለብዎት (ለምሳሌ ኮንዶም ወይም መቆጠብ)።

የኮቪድ-19 ምልክቶች ከተባባሱ ምን ማድረግ ይገባኛል?

ካልተሻልዎት ወይም ከ5 ቀናት በኋላ ከባሰብዎት የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያነጋግሩ።

ከባድ ምልክቶች ከታዩ ወደ 911 ይደውሉ ወይም ወደ ድንገተኛ ክፍል ይሂዱ። ከባድ ምልክቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡-

- የመተንፈስ ችግር
- የደረት ሕመም
- ራስን መሳት
- ግራ መጋባት

ይህ መረጃ ከጃኑዋሪ 2023 ጀምሮ ትክክለኛ ነው።

ይህን መረጃ ተደራሽ በሆነ ቅርጸት ይፈልጋሉ?

1-877-280-8538፣ TTY 1-800-855-0511፣ info@ontariohealth.ca

Publication No. 301212 (Amharic)

ISBN No. 978-1-4868-6843-8 (PDF)

© King's Printer for Ontario, 2023