

آپ کو پاکسلوڈ (Paxlovid) کے بارے میں کیا جاننے کی ضرورت ہے

پاکسلوڈ کیا ہے؟

پاکسلوڈ ایک دوا ہے جو آپ کو کوویڈ-19 کی بیماری سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔

اس میں دو دوائیں (نرمائزیلور اور رٹوناور) شامل ہیں، جو آپ کے جسم کے اندر کوویڈ-19 وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے آپس میں مل کر کام کرتی ہیں۔

پاکسلوڈ آپ کی بیماری کی علامات کو مزید خراب ہونے سے روک سکتی ہے اور کوویڈ-19 کی وجہ سے آپ کے ہسپتال جانے کے خطرے میں کمی لا سکتی ہے۔

پاکسلوڈ آپ کے کوویڈ-19 سے دوبارہ متاثر ہونے کے خطرے کو نہیں روکے گی۔

پاکسلوڈ ویکسینوں کا متبادل نہیں ہے۔ کوویڈ-19 کی انفیکشن شدید ہونے کے خلاف بہترین دفاع، ویکسین کے ساتھ تازہ ترین رہنا ہے۔

پاکسلوڈ کس کو دی جانی چاہیے؟

اگر آپ کو کوویڈ-19 سے شدید بیماری کا زیادہ خطرہ ہو، تو آپ پاکسلوڈ لے سکتے ہیں۔ آپ کو علامات کے آغاز سے پانچ دنوں کے اندر پاکسلوڈ شروع کر لینی چاہیے، تاکہ یہ اچھی طرح کام کر سکے۔

آپ کی بیماری کا سنگین ہونے کا خطرہ آپ کی صحت، عمر اور ویکسینیشن کی حیثیت پر منحصر ہے۔

ہیلتھ کیئر پرووائیڈر آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ آیا آپ کو زیادہ خطرہ لاحق ہے یا نہیں۔ آپ یہ دیکھنے کے لیے اونٹاریو کے سکریئر ٹول کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کو زیادہ خطرہ ہے: <https://covid-19.ontario.ca/covid-treatment-screener>

درج ذیل صورتوں میں آپ کو زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے:

✓ آپ کی عمر 60 سال یا زیادہ ہو؛

✓ آپ کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہو اور آپ کا جسمانی مدافعتی نظام کمزور ہو (جو صحت کے کسی مسئلے یا ادویات کی وجہ سے کمزور ہو سکتا ہے)؛

✓ آپ کی عمر 18 تا 59 سال ہو اور آپ کے جسم میں کوویڈ-19 کے خلاف کافی قوت مدافعت موجود نہ ہو (مثال کے طور پر، آپ کو ویکسین نہ لگائی گئی ہو یا ویکسین کی خوراک لینے کے بعد یا کوویڈ-19 سے بیمار ہونے کے بعد چھ ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہو)

✓ 18 سے 59 سال کی عمر میں ایک یا زیادہ ایسے طبی مسائل لاحق ہوں جو آپ کو کوویڈ-19 کے زیادہ شدید خطرے میں ڈالتے ہوں۔ کچھ طبی مسائل جو آپ کو کوویڈ-19 کے زیادہ شدید خطرے میں ڈال سکتے ہیں، وہ درج ذیل ہیں:

- کینسر
- دماغ و شریانوں کی بیماری (مثلاً فالج)
- گردوں کی بیماری
- جگر کی بیماری
- پھیپھڑوں کی بیماری
- بلغمی کیفیت
- ذیابیطس
- معذوریاں
- دل کے مسائل
- ایچ آئی وی انفیکشن
- دماغی صحت کی بعض بیماریاں
- موٹاپا
- حمل اور حالیہ حمل
- سگریٹ نوشی (موجودہ اور سابقہ)
- تپ دق

اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوویڈ-19 سے سنگین بیماری کا زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو اختیارات پر بات کرنے کے لیے ہیلتھ کیئر پرووائیڈر بات کریں۔

میرے خیال میں مجھے کوویڈ-19 ہے۔ میں پاکسلوڈ کیسے حاصل کروں؟

آپ اپنی علامات کو یہاں چیک کر سکتے ہیں: covid-19.ontario.ca/exposed#symptoms

اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سنگین بیماری کا زیادہ خطرہ لاحق ہے اور آپ میں کوویڈ-19 کی علامات موجود ہیں، تو آپ درج ذیل کر سکتے ہیں:

- اپنی فارمیسی سے رابطہ کریں (بہت سے فارماسسٹ بھی پاکسلوڈ لکھ سکتے ہیں)
- اپنے پرائمری ہیلتھ کیئر پرووائیڈر (فیملی ڈاکٹر یا نرس پریکٹیشنر) سے رابطہ کریں

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یا مدد کی ضرورت ہے، تو آپ Health811 سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ 811 پر کال کریں یا کسی نرس سے آن لائن بات کرنے کے لیے ontario.ca/health811 پر جائیں۔

ہے۔ اگر آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت ہو، تو وہ آپ کی مدد کریں گے۔

کیا پاکسلوڈ مفت ہے؟

پاکسلوڈ، ہیلتھ کیئر پرووائیڈر کے نسخے کے ساتھ مفت ہے۔ پاکسلوڈ حاصل کرنے کے لیے آپ کو OHIP کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔

مجھے پاکسلوڈ کیسے لینا ہو گی؟

پاکسلوڈ کسی مائع کے ساتھ (بذریعہ منہ) دن میں دو بار، پانچ دن تک لی جاتی ہے۔

پاکسلوڈ صبح اور شام کی خوراک کے ساتھ ایک پیکیج میں آتی ہے۔ ہر خوراک میں 2 گولیاں نرمائریلور (گلابی گولیاں) اور 1 گولی رٹوناور (سفید گولی) شامل ہوتی ہیں۔

گردے کی بیماری میں مبتلا افراد کو کم خوراک تجویز کی جا سکتی ہے۔

آپ کو صبح کی تینوں گولیاں روزانہ ایک ہی وقت پر اور شام کی تینوں گولیاں روزانہ ایک ہی وقت پر، پورے 5 دن تک لینا چاہیں۔ پاکسلوڈ کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بغیر بھی لی جا سکتی ہے۔

اگر آپ پاکسلوڈ کی ایک خوراک بھول جاتے ہیں اور اگر ایسا دو لینے کے وقت سے 8 گھنٹے کے اندر ہوتا ہے، تو جیسے ہی آپ کو یاد آئے، اسے لے لیں۔ اگر بھولی ہوئی خوراک کا وقت 8 گھنٹوں سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو بھولی ہوئی خوراک کو چھوڑ دیں اور اگلی خوراک اپنے باقاعدہ وقت پر لیں۔ ایک ہی وقت میں پاکسلوڈ کی 2 خوراکیں (6 گولیاں) نہ لیں۔

پاکسلوڈ کو ہمیشہ بالکل اسی طرح لیں، جیسا کہ آپ کے ہیلتھ کیئر پرووائیڈر نے آپ کو بتایا ہے۔

پاکسلوڈ کا علاج حاصل کرنے کے دوران بھی آپ بیماری پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں اور آپ کو انفیکشن کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے صحت عامہ کے اقدامات پر عمل کرنا چاہیے۔ عوامی صحت کے اقدامات کے بارے میں مزید یہاں پڑھیں: <https://www.ontario.ca/page/public-health-measures-and-advice>

پاکسلوڈ کے ممکنہ ضمنی اثرات کیا ہیں؟

پاکسلوڈ لینے کے دوران، آپ کو درج ذیل ضمنی اثرات کا تجربہ ہو سکتا ہے:

- ذائقہ میں تبدیلی
- پیچس

Health811 آپ کو ورچوئل نگہداشت کے مشورے سے منسلک کر سکتا ہے، اگر یہ آپ کے لیے موزوں ہے۔

جیسے ہی آپ میں علامات ظاہر ہونے لگیں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ جلد از جلد ہیلتھ کیئر پرووائیڈر سے بات کر لیں۔ آپ کو علامات کے آغاز سے پانچ دنوں کے اندر پاکسلوڈ شروع کر لینی چاہیے، تاکہ یہ اچھی طرح کام کر سکے۔

اگر آپ کی علامات شدید ہوں، تو 911 پر کال کریں یا ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں جائیں۔ شدید علامات میں درج ذیل شامل ہیں:

- سانس لینے میں دشواری
- چھاتی کا درد
- ہوش کھو جانا
- الجھن

جب میں اپنے ہیلتھ کیئر پرووائیڈر سے پاکسلوڈ کے بارے میں بات کروں، تو مجھے کون سی معلومات پاس رکھنے کی ضرورت ہو گی؟

ہیلتھ کیئر پرووائیڈر سے بات کرتے وقت، آپ کو درج ذیل چیزیں پاس رکھنی چاہیں:

- ان تمام ادویات کی فہرست جو آپ لے رہے ہیں، بشمول نسخہ جات اور زائد المیعیاد ادویات، وٹامنز اور ہربل سپلیمنٹس وغیرہ
- آپ کے طبی مسائل کی فہرست
- خون کے حوالے سے کسی معاملے کی نقل، اگر آپ کے پاس یہ دستیاب ہے

اگر آپ کو کوئی الرجی ہے، جگر یا گردے کی بیماری ہے یا اگر آپ حاملہ ہیں، دودھ پلا رہی ہیں یا ہارمونل برتھ کنٹرول (جیسے پیدائش پر قابو پانے کی گولیاں یا پیچ) استعمال کر رہی ہیں، تو اس بارے میں اپنے ہیلتھ کیئر پرووائیڈر کو ضرور بتائیں۔

کیا پاکسلوڈ حاصل کرنے کے لیے، مجھے کوویڈ-19 کا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہو گی؟

پاکسلوڈ حاصل کرنے کے لیے آپ کا کوویڈ-19 کا ٹیسٹ مثبت آنا چاہیے۔ یہ پی سی آر، ریپڈ مالیکیولر ٹیسٹ یا ریپڈ اینٹیجین ٹیسٹ ہو سکتا ہے (چاہے گھر پر کیا گیا ہو)۔

پاکسلوڈ کے بارے میں ہیلتھ کیئر پرووائیڈر سے بات کرنے سے پہلے، آپ کو مثبت ٹیسٹ لے کر جانے کی ضرورت نہیں

کیا میں دوسری ادویات لیتے ہوئے بھی پاکسلوڈ لے سکتا/سکتی ہوں؟

- ہائی بلڈ پریشر
- پٹھوں میں درد
- پیٹ درد
- متلی
- عام طور پر بیمار محسوس کرنا

پاکسلوڈ عام طور پر استعمال ہونے والی بہت سی ادویات اور سپلیمنٹس کے ساتھ تعامل کر سکتی ہے۔ ایک ہیلتھ کیئر پرووائیڈر (مثال کے طور پر ایک فارماسسٹ) آپ کی دوسری دوائیوں میں کچھ تبدیلیاں کر سکتا ہے تاکہ آپ پاکسلوڈ کو محفوظ طریقے سے لے سکیں۔

پاکسلوڈ ہارمونل برتھ کنٹرول کے طریقہ کار کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ پاکسلوڈ لیتے وقت آپ کو مائع حمل کا کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرنا چاہیے (مثال کے طور پر کنڈوم یا پریبیز)۔

آپ کو دوسرے ضمنی اثرات بھی محسوس ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی ایسے ضمنی اثرات ہیں، جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں یا ختم نہیں ہو رہے، تو اپنے ہیلتھ کیئر پرووائیڈر سے بات کریں۔

پاکسلوڈ کے دیگر نایاب لیکن ممکنہ ضمنی اثرات یہ ہیں:

- **الرجی سے متعلقہ رد عمل۔** پاکسلوڈ لینا بند کر دیں اور اگر آپ کو الرجی کے رد عمل کی درج ذیل علامات میں سے کوئی علامت محسوس ہوتی ہے، تو فوراً اپنے ہیلتھ کیئر پرووائیڈر کو کال کریں: آپ کی جلد پر خارش کے دھبے (دانے)، نکلنے یا سانس لینے میں دشواری، سوجے ہوئے بونٹ، چہرہ یا زبان، گلے میں خارش یا کھردرا پن۔
- **جگر کے مسائل۔** اگر آپ میں جگر کے مسائل کی ان نشانیوں اور علامات میں سے کوئی موجود ہیں، تو اپنے ہیلتھ کیئر پرووائیڈر کو فوراً بتائیں: جلد یا آنکھیں زرد ہونا (یرقان)، غیر معمولی طور پر سیاہ رنگ کا پیشاب، آپ کے پیٹ کے دائیں جانب نیا درد۔
- **ایچ آئی وی ادویات کے خلاف مزاحمت۔** اگر آپ کو ایچ آئی وی انفیکشن ہو اور اس کا علاج نہ ہوا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ پاکسلوڈ کی وجہ سے مستقبل میں ایچ آئی وی کی کچھ ادویات کام نہ کریں۔

اگر میری کوویڈ-19 کی علامات مزید خراب ہو جائیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟

اگر آپ بہتر نہیں ہوتے یا 5 دن کے بعد بھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، تو اپنے ہیلتھ کیئر پرووائیڈر سے بات کریں۔

اگر آپ کی علامات شدید ہو جاتی ہیں، تو 911 پر کال کریں یا ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں جائیں۔ شدید علامات میں درج ذیل شامل ہیں:

- سانس لینے میں دشواری
- چھاتی کا درد
- ہوش کھو جانا
- الجھن

یہ معلومات جنوری 2023 سے درست ہیں۔
یہ معلومات آپ کو قابل رسائی شکل میں درکار ہے؟
1-877-280-8538, TTY 1-800-855-0511,
info@ontariohealth.ca

Publication No. 301233 (Urdu)
ISBN No. 978-1-4868-6864-3 (PDF)
© King's Printer for Ontario, 2023